

〈G-B療法〉

インターバル:28日

注射薬

	薬品名	投与量	点滴時間	day1	2	...	8	...	15	...	28
RP01	オビヌツズマブ 生理食塩液	1000mg in 210mL	180分	↓			↓		↓		
RP02	グラニセトロン	1mg	30分	↓	↓						
RP03	ベンダムスチン 生理食塩液	90mg/m ² in 250mL	60分	↓	↓						

内服薬

	薬品名	投与量	投与日数	day1	2	...	8	...	15	...	28
RP1	アセトアミノフェン錠	500mg	1日分	↓			↓		↓		
RP2	ジフェンヒドラミン錠	50mg	1日分	↓			↓		↓		
RP3	プレドニン錠	100mg	1日分	↓			↓		↓		

day1のプレドニン100mgはオビヌツズマブ投与の1時間前までに内服する。

day8,15は、day1のオビヌツズマブ投与でgrade3以上のInfusion reactionを認めた場合には、プレドニン100mgはオビヌツズマブ投与の1時間前までに内服する。

オビヌツズマブ 投与30分前までにアセトアミノフェン500mg、ジフェンヒドラミン50mg内服

* 50mg/時で開始し、30分毎に50mg/時ずつ、最大400mg/時まで上げることができる。

前回の投与でGrade 2以上のinfusion reactionが発現しなかった場合は、100mg/時 で投与を開始し、30分毎に100mg/時ずつ、最大400mg/時まで上げることができる。