

ビダーザを受けられる患者さんへ

患者ID:

氏名:

主治医:

担当医:

受持看護師:

	入院日	入院2日目	入院3日目	入院4日目	入院5日目	入院6日目	入院7日目	退院日
目標	 治療の内容が理解できる	<ul style="list-style-type: none"> ・体温・脈拍・血圧が安定している ・感染予防対策について理解できる ・副作用症状(吐き気や便秘など)の対処方法が理解できる 						退院後の生活について分からないことがあれば聞くことができる
治療処置		 <ul style="list-style-type: none"> ・全身状態を観察するため、点滴中は心電図モニターを装着します ・輸血が必要な方は、適宜輸血があります。 						
点滴		7日間毎日点滴をします(1時間以内に点滴が終わります)						
内服薬	持参された内服薬は一旦看護師が預かります 内服薬は、医師に確認します	 通常通り、内服薬を飲んで下さい						
検査	採血があります					採血があります		
安静度	制限はありません	点滴中は、なるべく安静にして下さい						
食事		制限はありません 						
清潔		点滴が入っている間も、防水カバー(クイックカバー)を使用してシャワー浴ができます。(必要時売店で購入して下さい)						
排泄		抗癌剤治療により、便秘になることがあります。便の回数や性状を確認しましょう。						
説明	患者さん確認のためリストバンドをつけます 入院生活のパンフレットに沿って説明、病棟案内を行います 入院診療計画書の説明を行います 署名をして看護師に渡して下さい 医師から点滴の説明を行い、同意書を頂きます「抗癌剤治療を受ける患者さんご家族の方」のパンフレット【特に、排泄の注意点(P.4)】をよく読み、分からないところがあればお聞き下さい。	何か変化があった場合には、すぐにナースコールで看護師を呼んで下さい。  <ul style="list-style-type: none"> * 副作用症状は個人差があります。症状が出現した場合には早めに看護師に相談して下さい。(以下のような副作用があります) * 便秘は抗癌剤投与3日目から1週間程度みられることがあります。下剤で調整をします。 * 骨髄抑制(免疫力低下・貧血・出血)は投与1週間目から2週間程度みられます。病室から出るときは、マスクの着用、行動前後には手洗い・うがいをしましょう。 * その他の副作用として身体のだるさ・頭痛・めまい・ふらつきなどが起こることがあります。<u>転倒に注意</u>しましょう。 						次回の来院日時を確認してください 