
















CHOP療法(初回)を受けられる患者さんへ

患者ID: _____ 氏名: _____
 主治医: _____ 担当医: _____ 受け持ち看護師: _____

	入院日	CHOP療法1日目	CHOP療法翌日
目標	治療の必要性、スケジュール、合併症や副作用を理解できる 	体温・脈拍・血圧が安定している 副作用が理解できる 治療に伴う症状に気づくことができ、知らせることができる 点滴の針が入っているところの赤み・腫れ・痛みがない 	体温・脈拍・血圧が安定している 副作用が理解できる 治療に伴う症状に気づくことができ、知らせることができる 
治療		点滴中は心電図モニターを装着します	副作用症状に対して必要時治療を行います
点滴		点滴を2時間行います 点滴中、トイレ以外は安静にしてください	
内服薬		 プレドニンの内服が5日間始まります 	
検査	身体の状態に応じて検査を行っていきます 		
安静度	制限はありません		制限はありません
食事	 	制限はありません 食欲がない時は、食事の内容を変えることができます。ご相談ください	
清潔		点滴前か後に、清拭やシャワー浴ができます 	状態に応じて、清拭やシャワー浴ができます 入院中、できる限りシャワー浴をし身体を清潔に保ちましょう 
排泄		抗癌剤治療により、 <u>排便障害(便秘)</u> になることがあります 便の回数や硬さ、色、量を教えてください	
説明	* 医師から治療について説明があります * 「 抗がん剤治療を受ける患者さんとご家族の方、抗がん剤治療当日の説明用紙 」のパンフレット【特に、 排泄の注意点(P.4) 】をよく読み分らないところがあればお聞き下さい 	* CHOP療法は、血管から漏れた時に赤みや腫れ、痛みが出てくる場合があります 点滴中に違和感が生じたらナースコールを押して下さい ・点滴の針が入っている周囲の 赤み、痛み、腫れ * ドキソルピシンの影響で、 尿が赤くなる ことがあります * プレドニン錠の影響で、食欲増進・不眠・倦怠感・胃痛などが生じる場合があります 	* 病室外に出る際は、マスクの着用、行動前後には手洗い・うがいをお願いします 治療中のみなさまへ 抗がん剤治療は長期に及びます。長い治療の中で体調が優れない日や、悩んだり、不安な日があると思います。そんなときは1人で抱え込まずに私達スタッフにいつでもお話しください。みなさまのお力になれるように、さまざまな職種のスタッフでサポートさせていただきます。 