



前立腺高線量組織内照射(HDR)を受けられる方へ

	入院日	治療前々日	検査前日	治療日	治療後1日目	治療後2日目	治療後3～5日
目標	治療がスムーズに受けられるよう援助する			不安なく治療が受けられる 疼痛緩和、異常の早期発見	疼痛緩和、異常の早期発見		
処置 注射 内服	<ul style="list-style-type: none"> 採血・検尿があります 持参された薬を一旦看護師に預けていただきます 治療2日目より、毎食後に下剤の内服があります 	<ul style="list-style-type: none"> 眠前に下剤を飲んでいただきます 	<ul style="list-style-type: none"> 朝、浣腸をします 放射線部にて点滴を開始します 痛み止めの管を入れてから、アプリケーター針を挿入し、1回目の放射線治療を行った後一旦病室にベッドで戻ってきます 夕方2回目の照射をしにベッドのまま降りていきます 2回目の照射終了後病室に戻ってきてからアプリケーター針を抜きます 	<ul style="list-style-type: none"> 朝から内服薬再開です 医師の診察後、圧迫解除になれば、シャワー浴が許可されます 夕方点滴は終了です 	<ul style="list-style-type: none"> 抗生物質と尿の出をスムーズにするお薬が始まります 	<ul style="list-style-type: none"> 3日目に尿道の管を抜きます 	
清潔	入浴可	入浴可	入浴可	入浴可	シャワー浴	入浴可	
食事	特別な制限はありません	<ul style="list-style-type: none"> 低残渣食になります 病院食以外のものは食べないようにして下さい 昼食以降は欠食です 何も食べないようにしてください 夕方、アルジネートウォーターをお持ちします、朝までにすべて飲んでください 	<ul style="list-style-type: none"> 1日欠食ですが、水分は1回目の照射より帰室後3時間より可能です 看護師の指示に従ってください 	 <p>普通食</p>			
その他	<ul style="list-style-type: none"> 医師による説明があります 以下の物を準備してください <input type="checkbox"/>バスタオル1枚 <input type="checkbox"/>T字帯1枚 <input type="checkbox"/>フラットタイプの紙おむつ(3枚入り) 		<ul style="list-style-type: none"> 水分摂取中止時間は麻酔科医から説明があります アプリケーター針留置中は絶対安静です 	